
ÆQUO ADESTE ANIMO

FLORÆ DANICÆ
ICONUM
FASCICULUS SEPTIMUS.

MDCCLXVIII.

ICONES PLANTARUM

SPONTE NASCENTIUM

IN REGNIS

DANIÆ ET NORVEGIÆ,

IN DUCATIBUS

SLESVICI ET HOLSATIÆ,

ET IN COMITATIBUS

OLDENBURGI ET DELMENHORSTIÆ:

Ad illustrandum opus de iisdem Plantis, Regio jussu exarandum,

FLORÆ DANICÆ

NOMINE INSCRIPTUM;

Editæ ab ejus operis auctore,

GEORGIO CHRISTIANO OEDER,

M. D. PROF. REG. BOTAN.

VOLUMEN TERTIUM,

CONTINENS

FASCICULOS VII. VIII. IX.

SEU

TABULAS CCCLXI—DXL.

HAFNIÆ,

Typis CLAUDII PHILIBERTI.

MDCCLXX.

NOMENCLATURA ET LOCI NATALES PLANTARUM,

quas feptimus hic Fafciculus exhibet.

TAB. CCCLXI.

Dentaria baccifera. Cluf. pann. 445. Hift. CXXI. Kyll. Vir.
Dentaria, bulbifera, *foliis inferioribus pinnatis, fummis fimplicibus.* Linn. S. N. (edit. XII.) pag. 438. Hall. (hift. ftirp. helvet.) n. 470.
Germanice *Schuppenwurtz*, *Zahnkraut*, *Helkkraut*, Rupp.
Locus. In Sylvis umbrofis, paffim etfi rarius in Dania, e. g. in Promontorio Monæ, *Mœns Klint*, copiofius in fylvis Schlefvicenfibus, e. g. *Pulvermühle bey Schlefwig.*

TAB. CCCLXII.

Rapunculum alopecuron. Dod. pemt. 165.
Rapunculus fpicatus. C. B. P. 92. Kyll. Vir. *corniculatus fpica longiore.* Riv. monop. irreg. t. 109.
Phyteuma, fpicata, *fpica oblonga, capfulis bilocularibus, foliis radicalibus cordatis.* Linn. S. N. 163.
Rapunculus foliis radicalibus cordatis, tubis bicornibus, revolutis. Hall. 684.
Locus. Vulgaris in fylvis Slefvicenfibus, rarior in Oldenburgenfibus.

TAB. CCCLXIII.

Gratiola. Dod. purg. 119. Riv. monop. irreg. t. 106. Blakw. t. 411.
Gratiola, officinalis, *floribus pedunculatis, foliis lanceolatis ferratis.* Linn. S. N. 61. Hall. 329.
German. *Gottes Gnad.*
Locus. In Infulis *Albis* fluvii e regione urbis *Altona*, folo limofo pingui, inter fcirpos. In horto nobis femper decumbit.

TAB. CCCLXIV.

Fucus ferulaceus. Lob. Ic. T. 2. 255.
Potamogeton maritimum pufillum alterum, feminibus fingulis longis pediculis infidentibus. Plukn. t. 248. f. 4.
Bucca ferrea maritima, foliis acutiffimis. Mich. gen. 72. t. 35.
Ruppia maritima. Linn. S. N. 131. Hudf. angl. 63.
Locus. Paffim in foffis maritimis Daniæ & Ducatuum Comitatuumque, at copiofiffime in regionibus mari ereptis, *Marfchen.*

TAB. CCCLXV.

Saxifraga aurea. Dod. pemt. 316.
Sedum paluftre luteum, foliis fubrotundis, feffilibus. Morif. III. 477. f. 12. t. 8. f. 7.
Chryfofplenium, oppofitifolium, *foliis oppofitis.* Linn. S. N. 303. Hall. 1549. Hudf. angl. 156.
Locus. Paffim & copiofe ad fcaturigines fylvarum in Ducatu Schlefvicenfi, e. g. *Klofterholz*, mixta cum C. *alternifolio.*

TAB. CCCLXVI.

Saxifraga aurea. Dalech. Lugd. 1113. *rotundifolia aurea.* C. B. P. 309. Kyll. Vir.
Sedum paluftre luteum majus, foliis pediculis longis infidentibus. Morif. III. 477. f. 12. t. 8. f. 8.
Chryfofplenium, alternifolium, *foliis alternis.* Linn. S. N. 303. Hudf. angl. 156. Hall. 1548. Gunn. fl. Norv. 54.
Locus. Ad fcaturigines & in uliginofis fylvarum umbrofarum, in utroque regno & Provinciis Germanicis, vulgatior C. *oppofitifolio.*

TAB. CCCLXVII.

Gentiana, campeftris, *corollis quadrifidis, fauce barbatis.* Linn. S. N. 200. Gunn. Norv. 96. Ström. I. 96. Kyll. apud Holm. Fl. Dan. 391.
Gentiana faucibus barbatis, calycis foliis quaternis, alterne majoribus. Hall. 650.

 Anti-

Antiquorum synonyma omitto quippe ambigentia inter hanc & G. *Amarellam*, distinctam calyce æquali, etiam ubi quaternarius numerus in flore obtinet.
Norvegis *Stinggræss*, *Holgræss*. Gunn.
Locus. Vulgatissima in Norvegia, nec rara in Dania & provinciis germanicis, in pascuis.

Tab. CCCLXVIII.

Trifolium siliquosum, loto affine, siliquis ornithopodii. Plukn. t. 68. f. 1.
Fœnu græcum humile repens, ornithopodii siliquis brevibus erectis. Raj. Syn. III. 331. t. 14. f. 1.
Trifolium, M. ornithopodioides, *leguminibus nudis octospermis subternis, calyce duplo longioribus, caulibus declinatis.* Linn. S. N. 501. Hudf. angl. 282.
Locus. In Insulæ *Sylt* parte septentrionali *Lyst* dicta, in pascuis arenosis.

Tab. CCCLXIX.

Gramen cyperoides minimum spica cassa simplici. Moris. III. f. 8. t. 12. f. 22.
Carex, dioica, *spica simplici dioica.* Linn. S. N. 616. Hudf. 347.
Ill. Haller. n. 1350. comprehendit duas Ill. Linn. species C. *dioicam* & C. *pulicarem.*
Locus. Non rara in paludibus turfosis.

Tab. CCCLXX.

Gramen cyperoides, angustifolium, spicis parvis sessilibus, in foliorum alis. Plukn. t. 34. f. 3. Moris. III. f. 8. t. 12. f. 17.
Cyperoides angustifolium, spicis sessilibus, in foliorum alis. Scheuchz. agr. 483.
Carex, remota; *spicis ovatis subsessilibus remotis androgynis, bracteis culmum æquantibus.* Linn. S. N. 617. Hudf. 350. Mull. Fridr. 754. 756.
Carex spicis androgynis, imis in ala folii prælongi sessilibus, supremis nudis. Hall. 1357.
Locus. Non rara in sylvis Daniæ, & vulgaris in sylvis Schlesvicensibus umbrosis uliginosis.

Tab. CCCLXXI.

Gramen cyperoides parvum. Ger. emac. 21.
Gramen cyperoides spica e pluribus spicis brevibus mollibus composita. Raj. Syn. III. 422. n. 2.
Carex, divisa, *spica composita spiculis rotundis confertis androgynis, foliolo longiori instructis, culmo subtereti.* Hudf. 348.
Locus. Copiose in convallibus collium arenæ mobilis (Dunen) insulæ *Sylt* & Eyderstettensibus.

Tab. CCCLXXII.

Gramen cyperoides minus ranunculi capitulo rotundo. Moris. III. f. 8. t. 12. f. 36.
Carex, capitata, *spica simplici androgyna ovata: superne mascula, capsulis imbricato patulis.* Linn. S. N. 616. Hudf. 347.
Carex spica unica, subrotunda, feminibus inflatis. Hall. 1351.
Locus. Passim in paludibus cespitosis.

Tab. CCCLXXIII.

Campanula esculentæ facie, ramis & floribus patulis. Dill. Elth. p. 68. t. 58.
Campanula, patula, *foliis strictis, radicalibus lanceolato ovalibus, panicula patula.* Linn. S. N. 159. Hudf. 80. Hall. 698. Holm. Fl. D. 907. Mull. Fridr. 172.
Locus. In Holsatia vulgarem, potissimum circa *Lubec*, solo argilloso, in sepibus, in Dania nondum observavi.

Tab. CCCLXXIV.

Lysimachia cæruleo flore. Clus. Hist. LII. Dod. pemt. 86.
Veronica spicata. Riv. Monop. irreg. t. 97.
Veronica, maritima, *spicis terminalibus, foliis ternis inæqualiter serratis.* Linn. S. N. 57. Gunn. Norv. 74. Kyll. Vir 1057. secundum Holm.
Locus. In Finmarkia S. V. Gunnerus, ego in Comitatu Oldenburgensi ad ripam fluvii *Hunte* prope *Dötlingen.*

Tab. CCCLXXV.

Tulipa minor lutea. C. B. P. 63.
Tulipa, sylvestris, *flore subnutante, foliis lanceolatis.* Linn. S. N. 241. Fl. Sv. 284. Holm. Fl. Dan. Hall. 1236.
Locus. In vallo castelli Hafniensis (*Castells Wall*) & in septis incultis (*Wildnisse*) Horti Rosenburgensis, ut tamen pro vera indigena vix possit recipi.

Tab.

Tab. CCCLXXVI.

Ranunculo sive Polyanthemo aquatili albo affine millefolium maratriphyllum fluitans. J. B. II. 774.
Ranunculus aquatilis, albus, fluitans, Peucedani foliis. Herm. Lugdb. 516.
Ranunculus caule fluitante, petiolis unifloris, foliis capillaceis, longissimis, laciniis parallelis. Hall. 1161. Rupp. Jen. Hall. 104. *Ranunculus* aquatilis d. Linn. Sp. pl. 782.
Locus. In fluentis rapidioribus, e. g. fluvio *Hunte* prope *Dödlingen.*

Tab. CCCLXXVII.

Polygonatum flore odoro. Cluf. pann. 263. & *latifol.* Dodon. pemt. 346. Kyll. Vir. 812.
Convallaria, polygonatum, *foliis alternis amplexicaulibus, caule ancipiti, pedunculis axillaribus subunifloris.* Linn. S.N. 246. Hall. 1242. Gunn. Norv. 248.
Danice nominibus cum *C. multiflora* communibus, *Gietrams, Skiörpgrass, Salomons Seigl.* Gunn. *Hvidroed, Værkurt, Salomons Signet.* Kyll. Germanice *Weisswurtz.*
Locus. In Dania non obfervavi, in Norvegia cum *C. multiflora*, fed rarior, paffim in fylvaticis faxofis afperis.

Tab. CCCLXXVIII.

Ornithogalum luteum. C. B. P. 71. Kyll. Vir.
Ornithogalum, luteum, *fcapo angulofo diphyllo, pedunculis umbellatis fimplicibus.* Linn. S. N. 242. Hall. 1213.
Locus. In Daniæ & Provinciarum Germanicarum fepibus & dumetis, potiffimum hortorum feptis incultis.

Tab. CCCLXXIX.

Cyperoides polyftachion lanuginofum. Morif. 111. f. 8. t. 12. f. 10. Scheuchz. agroft. 478.
Carex, hirta, *fpicis remotis, mafculis pluribus, fœmineis fubpedunculatis erectis, capfulis hirtis.* Linn. S. N. 618.
Locus. Paffim in fabulofis humidis.

Tab. CCCLXXX.

Gramen typhinum. Lobel. Ic. 10. Kyll. Vir. 432.
Gramen nodofum fpica parva. C. B. P. 3.
Phleum, nodofum, *fpica cylindrica, culmo adfcendente, foliis obliquis, radice bulbofa.* Linn. S.N. 88. Hudf. angl. 23. Hall. 1530. Schreb. gram. p. 102. qui cum *P. pratenfi L.* conjungit.
Locus. Paffim in pafcuis, & agrorum limitibus.

Tab. CCCLXXXI.

Gramen miliaceum aquaticum. Raj. Syn. III. 402. Scheuchz. agr. 176.
Aira, aquatica, *panicula patente, floribus muticis, lævibus, calyce longioribus, foliis planis.* Linn. S. N. 91. Hudf. angl. 29. Hall. 1471. Holm. Fl. Dan.
Locus. In foffis minus frequens.

Tab. CCCLXXXII.

Gramen paniculatum minimum molle. Scheuchz. agr. 215. t. 4. f. 15.
Aira, caryophyllæa, *foliis fetaceis, panicula divaricata, floribus ariftatis diftantibus.* Linn. S. N. 92. Hudf. angl. 31. Hall. 1482.
Locus. Vulgatiffima in Holfatia in pafcuis glareofis & ericetis, nec rara in Dania.

Tab. CCCLXXXIII.

Gramen minimum, fpica brevi habitiore, noftrum. Scheuchz. agr. 219.
Aira, præcox, *foliis fetaceis: vaginis angulatis, floribus paniculato fpicatis, flofculis bafi ariftatis.* Linn. S. N. 92. Hudf. 31. Holm. Fl. Dan.
Locus. Vulgaris in Daniæ & Slefvici Holfatiæque apricis.

Tab. CCCLXXXIV.

Fungoides nigricans majus cornucopiæ forma. Vaillant. t. 13. f. 2. 3.
Peziza, cornucopioides, *infundibuliformis, difco patente finuato punctato.* Linn. S. N. 725. Hudf. 499. Schæff. fung. t. 165. 166. Hall. 2216. Mull. Fridrichsd. 1072.
Locus. Paffim in fylvis.

Tab. CCCLXXXV.

Lingua major. Dalech. Lugdun. 1037.
Conyza maxima aquatica ferrato folio. Thal. Herc. 21. t. 3.
Senecio, paludofus, *corollis radiantibus, foliis enfiformibus, acute ferratis, fubtus fubvillofis, caule ftricto.* Linn. S. N. 552. Hall. 66.
Locus. Rarius ad fluvios, e. g. in Comitatu Oldenburgenfi ad *Zwifchenahn*, in amne, *Aue.*

Tab. CCCLXXXVI.

Cardamine petræa cambrica, naflurtii facie. Dill. Elth. t. 61. f. 71.
Cardamine, petræa, *foliis fimplicibus oblongis dentatis.* Linn. S. N. 438. Hudf. 254.
Locus. In *Leerdalen* Diœcefis Bergenfis, in infulis quas fluvius format, folo glareofo.

Tab. CCCLXXXVII.

Ophrys, fpiralis, *bulbis aggregatis oblongis, caule fubfoliofo, floribus fpirali fecundis, nectarii labio indivifo crenulato.* Linn. S. N. 592. Hudf. 338.
Epipactis bulbis cylindricis, fpica fpirali, labello crenulato. Hall. 1294. t. 38.
Locus. In collibus apricis tenui gramine veftitis prope *Apenrade, Steenberger Knap ved Blasholm.*

Tab. CCCLXXXVIII.

Gramen dactylon folio latiore. Scheuchz. agr. 101. t. 2. f. 2. G. H. Morif. III. f. 8. t. 3. f. 2.
Panicum, fanguinale, *fpicis digitatis bafi interiore nodofis, flofculis geminis muticis, vaginis foliorum punctatis.* Linn. S. N. 87. Hudf. 22.
Digitaria foliis fubhirfutis, caule debili, fpicis verticillatis, fcapo ancipite. Hall. 1526.
Locus. Vulgatiffima in Schlefvici & Holfatiæ agris, campis & viis fabulofis, glareofis.

Tab. CCCLXXXIX.

Alfine tenuifolia. J. B. III. 364. Vaill. t. 3. f. 1. Seguier. I. 418. t. 6. f. 2.
Arenaria, tenuifolia, *foliis fubulatis, caule paniculato, capfulis erectis, petalis calyce brevioribus lanceolatis.* Linn. S. N. 313. Hudf. 168. Hall. 866.
Locus. Copiofe in agris editis inter *Plœn* & *Schönweide*, inter ftipulas.

Tab. CCCXC.

Saxifraga foliis caulinis palmatis petiolatis, caule bulbifero fubramofo & multifloro. an S. *bulbifera?*
Locus. Ex Islandia attulit Clar. J. G. Kœnig, lectam prope *Adner See, Saide Field, Hraffntinna Fiel* prope *Kraffle.*

Tab. CCCXCI.

Filix pumila lonchitidis marantæ fpecies cambrobritannica &c. Plukn. t. 89. f. 5.
Filicula alpina tenerior, alis latiufculis brevioribus integris profunde dentatis. Morif. III. f. 14. t. 3. f. 23.
Acroftichon, Ilvenfe, *frondibus fubbipinnatis, pinnis oppofito coadunatis, obtufis, fubtus hirfutis, bafi integerrimis.* Linn. S. N. 687. Hudf. 383.
Locus. In rupibus alpinis Norvegiæ & Iflandiæ.

Tab. CCCXCII.

Fucus phafganoides & polyfchides. Ger. emac. 1570.
Fucus arboreus polyfchides edulis. C. B. P. 364. Prodr. 154. 2.
Fucus, digitatus, *caule tereti breviffimo, fronde palmata laciniis enfiformibus.* Hudf. 474. n. 41.
Fucus fcoparius. Ström. Sundm. I. 93.
Fucus, hyperboreus, *fronde fimplici palmata, caule longiffimo.* Gunn. Norv. 61. t. 3.
Fucus, digitatus, *fronde palmata, foliolis enfiformibus, ftirpe tereti.* Linn. S. N. 718. Mant. 134.
Locus. Oceanus Norvegiam & Iflandiam alluens.

Tab. CCCXCIII.

Fucus palmaris tenuis, in orbem expanfus, in fegmenta bifida breviora teretia divifus. Morif. III. f. 15. t. 9. f. 9.
Fucus, faftigiatus, *fronde filiformi dichotoma ramofiffima faftigiata obtufa.* Linn. S. N. 718. Hudf. 467.
Locus. Vulgaris in mari baltico & atlantico.

Tab.

Tab. CCCXCIV.

Fucus fronde cartilaginosa, plana, supradecomposita, segmentis linearibus, apice globuliferis. An F. gigartinus Linn. S.N. 719?
Locus. In oceano Islandiam alluente, *J. G. Kœnig.*

Tab. CCCXCV.

Conferva marina geniculata nigra palmata. Dill. Musc. t. 6. f. 35.
Conferva, polymorpha, *filamentis geniculatis, ramis fasciculatis.* Linn. S. N. 721. Hudf. 483.
Locus. Frequens in littoribus marinis.

Tab. CCCXCVI.

Anthoceros foliis minoribus magis laciniatis. Dill. Musc. t. 68. f. 1.
Anthoceros, punctatus, *frondibus indivisis sinuatis punctatis.* Linn. S. N. 708. Hudf. 441.
Locus. In cryptis rupium prope scaturigines calidæ in Islandia *J. G. Kœnig,*

Tab. CCCXCVII.

Ranunculus montanus subhirsutus latifolius. C. B. Prodr. 96.
Ranunculus nemorosus hirsutus foliis caryophyllatæ. Lœf. pruff. t. 71.
Ranunculus, lanuginosus, *calycibus patulis, pedunculis teretibus, caule petiolisque hirsutis, foliis trifidis lobatis crenatis holosericeis.* Linn. S. N. 379. Sp. pl. II. 780. Jacq. Vindob. 101. Hall. 1172.
Locus. Copiose in sylvis Schlesvicensibus, e. g. *Klosterholz.*

Tab. CCCXCVIII.

Rosa campestris odora. Clus. pann. III. 114. Dod. pemt. 187.
Rosa campestris spinosissima flore albo odoro. C. B. P. 483. Kyll. Vir. *Rosa pumila spinosissima, foliis Pimpinellæ glabris, flore albo.* J. B. II. 40.
Rosa, spinosissima, *germinibus globosis glabris, pedunculis hispidis, caule petiolisque aculeatissimis.* Linn. S. N. 348. Hudf. 191. Hall. 1106.
Locus. Copiose in Insulæ *Sylt* parte septentrionali *Lyst* dicta. Nec in Norvegia, nec hactenus in Dania observavi.

Tab. CCCXCIX.

Vicia lathyroides s. Lathyrus viciæ formis. Plukn. t. 71. f. 2.
Lathyrus, paluftris, *pedunculis multifloris, cirrhis polyphyllis, stipulis lanceolatis.* Linn. S. N. 487. Hudf. 277. Hall. 431. Muller Fridrichsd. 583.
Locus. Passim ad latera lacuum in pratis udis, e. g. in insulis lacus *Borresöe* insulæ *Monæ* copiosa.

Tab. CCCC.

Cynocrambe. Fuchs. hist. 444. fœm.
Mercurialis mas & fœmina. C. B. P. 121. Kyll. Vir.
Mercurialis, perennis, *caule simplicissimo, foliis scabris.* Linn. S. N. 657. Hall. 1601.
Danice *Bingel* Kyll. Germanice *Bingelkraut.*
Locus. Vulgaris in sylvis Daniæ & Ducatuum, in Norvegia non memini me observare.

Tab. CCCCI.

Filix saxatilis caule tenui fragili. Plukn. t. 180. f. 5.
Filix saxatilis regia fumariæ pinnulis. Vaill. t. 9. f. 1.
Polypodium, fragile, *frondibus bipinnatis; foliolis remotis: pinnis subrotundis incisis.* Linn. S.N. 693. Hall. 1707. qui monet hanc & proximam suam 1708. quæ est *P. regium* L. parum differre.
Locus. In rupium Norvegiæ & Bornholmiæ fissuris.

Tab. CCCCII.

Pyrola II. Clus. pann. 506.
Pyrola folio mucronato serrato. C. B. P. 191. Kyll. Vir. Riv. pentap. irreg. t. 138.

 Pyro-

Pyrola, fecunda, *racemo unilaterali.* Linn. S. N. 301. Hall. 1108. Ström. I. 117. Gunn. 120.
Danice *Vintergrön* Kyll. Norvegis *Soufpring* Gunn.
Locus. Paffim rarius in fylvis afperis mufcofis Norvegiæ & Daniæ.

Tab. CCCCIII.

Cyperoides alpinum tenuifolium fpica brevi ferruginea. Scheuchz. agr. 493. t. 11. f. 8.
Carex fpica androgyna terminali tripartita. Hall. 1356.
Locus. In alpibus Norvegiæ rarius, e. g. in *Söder Ranen.*

Tab. CCCCIV.

Gramen fylvarum tenuinus fpicatum. Scheuchz. agr. 418.
Carex, fylvatica, *fpicis pendulis, mafcula erecta, fœmineis filiformibus pedunculo brevioribus, capfulis acutis diftantibus.* Hudf. 353. n. 22. Bœhm. Lipf. 661. Hall. 1395.
Locus. Minime rara in fylvis Daniæ.

Tab. CCCCV.

Fucus digitatus alvearioruni. Lœfel. Pruff. p. 99. t. 17.
Locus. Hoc quod pictura exhibet exemplar inventum eft Hafniæ crefcens in canali ligneo domus.

Tab. CCCCVI.

Holofteo affinis cauda muris. C. B. P. 190. Kyll. Vir. Dod. pemt. 112.
Myofurus, minimus. Linn. S. N. 227. Hall. 1159.
Locus. Vulgaris in Dania in arvis & pafcuis fubglareofis.

Tab. CCCCVII.

Veronica terreftris annua, folio polygoni, flore albo. Morif. II. t. 24. f. 19.
Veronica, peregrina, *floribus folitariis feffilibus, foliis lanceolato linearibus, glabris obtufis integerrimis, caule erecto.* Linn. S. N. 59. Fl. Sv. 24. Holm. Fl. Dan.
Locus. In Amagria fponte nafci fcio, etfi ipfe non legi. In horto Botanico luxuriat nefcio unde allata.

Tab. CCCCVIII.

Fucus cartilagineo corneus teres, vagis ramis multifidus, apicibus acutis.
An *Fucus teres albus tenuiffime divifus.* Raj. Syn. III. 50. n. 51. adeoque *F. albus* Hudfoni?
Locus. In oceano Islandico, unde attulit *J. G. Kœnig.*

Tab. CCCCIX.

Sifymbrium, (islandicum?) *filiquis brevibus declinatis, foliis lyratopinnatis, foliolis ovalibus dentatis.*
Locus. In horto nobis luxuriat natum e feminibus a Dno *Kœnig* ex Islandia allatis, ubi crefcit prope fcaturigines calidæ, & alibi locis udis. Vereor autem ut a *S. fylveftri* fatis differat.

Tab. CCCCX.

Conyza media. Ger. emac. 482.
After pratenfis autumnalis conyzæ folio. J. R. H. Rup. Jen. Hall. 181.
After montanus flore magno luteo. Kyll. Vir. ex mente Holm. Fl. Dan. fed *I. dyfenterica* in aquofis minime in montanis nafcitur.
Inula, dyfenterica, *foliis amplexicaulibus cordato oblongis, caule villofo paniculato, fquamis calycinis fetaceis.* Linn. S. N. 557. Hudf. 320. Hall. 79.
Arnica Schwedenfis *nonnullorum.*
Locus. Abunde in foffis regionum maritimarum depreffarum (*Marfchen*) Holfatienfium, Schlefvicenfium & Oldenburgenfium.

Tab.

Tab. CCCCXI.

Scrophularia flore luteo. C. B. Prodr. 112. Riv. monop. irreg. t. 107.
Scrophularia, vernalis, *foliis cordatis, pedunculis axillaribus solitaris dichotomis.* Linn. S. N. 414. Hudf. 240. Hall. 327.
Locus. In fepibus prope *Scröe J. G. Kœnig.*

Tab. CCCCXII.

Apium fylvestre feu Thyffelinum. Dod. pemt. 699.
Selinum, fylveftre, *radice fufiformi multiplici.* Linn. S. N. 207. Hall. 800.
Locus. In Schlefvici & Holfatiæ pafcuis fylvaticis fubudis, vulgare.

Tab. CCCCXIII.

Conyza aquatica afteris flore aureo. C. B. Prodr. 124. Kyll. Vir. n. 90. ex mente Holm Fl. Dan.
Inula, britannica, *foliis amplexicaulibus lanceolatis ferratis diftinctis fubtus villofis, caule ramofo erecto villofo.* Linn. S. N. 551. Hall. 74.
Locus. In foffis & pafcuis udis Bornholmiæ & Holfatiæ.

Tab. CCCCXIV.

Alfine folio gramineo anguftiore paluftris. Dill. giff. app. 69.
Stellaria, graminea, *b.* Linn. Sp. pl. II. 604. Hall. 882.
Locus. Vulgaris locis udis graminofis.

Tab. CCCCXV.

Alfine longifolia uliginofis provenieus locis. J. B. III. 365. Kyll. Vir.
Alfine aquatica folio gratiolæ, ftellato flore. Dill. Giff. app. 39.
Stellaria, graminea, *c.* Linn. Sp. pl. II. 604.
Locus. Vulgaris in udis.

Tab. CCCCXVI.

Fucus, faccharinus, *fronde fubfimplici enfiformi, ftipite tereti breviffimo.* Linn. S. N. 718. Hudf. 474. Ström. I. 92. Gunn. 116.
Norvegis *Söll, Söllblad, Bladtarre, Butarre.* Ström. & Gunn.
Locus. In Oceano atlantico Norvegiam & Iflandiam alluente.

Tab. CCCCXVII.

Fucus, efculentus, *fronde fimplici indivifa enfiformi, petiolo pinnato folium percurrente.* Linn. S. N. 718. Mant. 135. Ström. Sundm. I. 93. Gunn. 313.
Norvegis *Bue Tare, lidet Tareblad, Skaalme Tare.* Ström. Gunn.
Locus. In Oceano Norvegico & Islandico.

Tab. CCCCXVIII.

Kœnigia islandica. Linn. S. N. 104. Mant. 35.
Locus. In Islandia detexit fæpius laudatus *J. G. Kœnig,* paffim ibi nafcentem locis argillofis inundatis, in alpibus & in littore maris, prope *Neff, Beffeftedt, Efian Reikium, Nuptuns Fiadl, Oerebacke, Hlidarende, Holte.*

Expectando proventum plantularum vivarum ex femine allato in horto nobis natarum demumque florentium diftulimus editionem Iconis. Interim *Kœnigiam* dixit *Ill. à Linné,* in novo S. N. cui *Bergeriæ* nomen deftinaverat Inventor in honorem Patroni fui Ill. *de Berger*, Archiatri Regii, ad exemplum Tournefortii, *Fagoniam* a *Fagonio* appellantis.

Tab. CCCCXIX.

Fucus parvus, fegmentis prælongis teretibus acutis. Morif. III. t. 15. t. 9. f. 4.

Fucus, furcellatus, *fronde filiformi dichotoma ramosissima acuminata.* Linn. S. N. 718.
Locus. In Oceano Norvegiam alluente.

Tab. CCCCXX.

Fucus fungularis Imperati 748. *F. fungis affinis.* C. B. P. 364. Moris. III. 645.
Locus. In oceano Islandico. *J. G. Kœnig.*

MONITUM.

Etsi iis, qui de nimio Iconum Floræ Danicæ pretio queruntur, uti sunt nonnulli, querendi justa causa non sit, nam tabulas aeri incisas, bonas nempe, pulchre impressas, pulchre coloribus superinductis pictas, quantumvis leve earum pretium statuatur, quando numero ad magnum cumulum increscunt, levi summa emi non posse paret, attamen ne sit, quod impediat, quo minus opus hoc Floræ Danicæ in publica commoda cedat, placuit Augustissimo Regi diminui pretium fasciculorum, qui sequentur, inde a septimo, adeo ut singuli fasciculi picti quidem constent octo imperialibus monetæ Danicæ ordinariæ (*Rigsdaler Courant*) sine coloribus autem duobus imperialibus cum dimidio.

Insuper, etsi injussus, etiam sex priores fasciculos eodem diminuto pretio vendam, puros nec pictos, nam pictos infra pretium 9 imperialium, ab initio cœpti operis emtoribus, subscriptione quæ dicitur, nomen dantibus concessum, vendere vetant graves sumtus, & incommoda aliis negotiis distento cura picturarum. Cumque progrediente opere præparatio novorum pictorum exemplarium inde a primo fasciculo inchoanda, in diem difficilior evadat, & vix inposterum promitti possit, monemus eos, quibus talia exemplaria arrident, ut velint ea expetere in tempore, antequam nobis labor, ipsis sumtus nimium increscunt.

Est porro indicandum emtoribus operis gratum ipsis sine dubio propositum nostrum, annuente Rege captum, edendi binos per singulos annos fasciculos, adeo ut octavum expectare liceat, proximo anno circa tempus Paschatis, nonum sub finem Septembris ejusdem anni, & sic porro.

HAFNIÆ, typis CL. PHILIBERT.


Prostat apud Autorem, & Bibliopolas Philibert & Heineck & Faber.







Flora Danica Tab.CCCLXIV.



Flora Danica Tab. CCCLXV.



Flora Danica Tab. CCCLXVI.




Flora Danica Tab. CCCLXVII.



Flora Danica Tab. CCCLXVIII.



Flora Danica Tab. CCCLXIX.





Flora Danica Tab. CCCLXXI.





Flora Danica Tab. CCCLXXII.

Flora Danica Tab. CCCLXXIII.



Flora Danica Tab. CCCLXXIV.











Flora Danica Tab. CCCLXXIX



Flora Danica Tab. CCCLXXX




Flora Danica Tab. CCCLXXXI.



Flora Danica Tab. CCCLXXXII.




Flora Danica Tab. CCCLXXXIII.













Flora Danica Tab. CCCLXXXIX





Flora Danica Tab. CCCXCI.





Flora Danica Tab. CCCXCIII




Flora Danica Tab. CCCXCIV



Flora Danica Tab. CCCXCV.











Flora Danica Tab. CCCXCIX.



Flora Danica Tab. CCCC.





Flora Danica Tab. CCCCII.



Flora Danica Tab. CCCCIII



Flora Danica Tab. CCCCIV.



Flora Danica Tab. CCCCV.



Flora Danica Tab. CCCCVI.



Flora Danica Tab. CCCCVII.



Flora Danica Tab CCCCVIII.



Flora Danica Tab. CCCCIX.











Flora Danica Tab. CCCCXIII.



Flora Danica Tab. CCCCXIV.










Flora Danica Tab. CCCCXVIII.



Flora Danica Tab. CCCCXIX.



Flora Danica Tab. CCCCXX.



FLORÆ DANICÆ
ICONUM
FASCICULUS OCTAVUS.

MDCCLXIX.

NOMENCLATURA
ET
LOCI NATALES PLANTARUM,
quas octavus hic Fasciculus exhibet.

Tab. CCCCXXI.

B istorta. Fuchs. 773. 774. Camer. epit. 683. *major.* C. B. P. 192. Kyll. Vir.
Polygonum, bistorta, *caule simplicissimo monostachio, foliis ovatis in petiolum decurrentibus.* Linn. S. N. 275. Hall. 1559.
Locus. In Insulis Albis e regione urbis *Altona*, etiam circa *Preez* Holsatiæ, solo limoso.

Tab. CCCCXXII.

Dracunculus aquatilis. Dod. pemt. 330. Kyll. Vir.
Calla, palustris, *foliis cordatis, spatha plana, spadice undique hermaphrodito.* Linn. S. N. 605.
Locus. Passim in Dania, in paludosis, omnium copiosissime in fossis regionum mari ereptarum Holsaticarum & Oldenburgensium.

Tab. CCCCXXIII.

Galium palustre album. C. B. P. 335. Kyll. Vir.
Galium, palustre, *foliis quaternis obovatis inæqualibus, caulibus diffusis.* Linn. S. N. 117. Hall. 719.
Locus. Passim in fossis, & rivulis, solo limoso.

Tab. CCCCXXIV.

Hieracium minus, dentis leonis folio oblongo glabro. C. B. P. 127.
Hypochæris, glabra, *glabra: calycibus oblongis imbricatis, caule ramoso nudo, foliis dentato sinuatis.* Linn. S. N. 526. Hort. Ups. 240. Sp. pl. 1140. Mull. Fridr. 640.
Locus. In agris Comitatus Oldenburgensis, in Dania *Linn. & Mull.*

Tab. CCCCXXV.

Carex spica mascula terminali, fœmininis tribus quatuore subsessilibus axillaribus distantibus per totum culmum foliosum, caule repente.
Locus. In arenosis maritimis & sylvaticis prope *Wemmeltofte* Siællandiæ.

Tab. CCCCXXVI.

Elatine. Cam. epit. 754.
Antirrhinum, elatine, *foliis hastatis alternis, caulibus procumbentibus.* Linn. S. N. 409. Hall. 340.
Locus. Vulgaris in arvis editis Holsatiæ & Schlesvici.

Tab. CCCCXXVII.

Epithymum seu cuscuta minor. C. B. P. 219. Cam. epit. 983.
Cuscuta, europæa epithymum, *floribus sessilibus*, (bracteis obvallatis quinquefidis.) Linn. S. N. 129. Sp. pl. II. 180. Lœfl. it. 216. Hall. 654. b.
Locus. In siccis apricis partis Insulæ *Sylt.* septentrionalis *Lyst* dictæ, Ericam obducens.

Tab. CCCCXXVIII.

Alsine hederulæ folio. C. B. P. 250. Kyll. Vir.
Veronica hederæ folio. Riv. Mon. 97.
Veronica, hederifolia, *floribus solitariis, foliis cordatis planis quinquelobis.* Linn. S. N. 58. Sp. pl. II. 19. Hall. 556.
Locus. Vulgaris in arvis & ruderatis.

Tab. CCCCXXIX.

Alſine plantaginis folio. J. B. hiſt. III. 364.
Arenaria, trinervia, *foliis ovatis acutis petiolatis nervoſis.* Linn. S. N. 312. Fl. Sv. 397. Hall. 878. Mull. Fridr. 367.
Locus. Non rara in umbroſis & nemoribus.

Tab. CCCCXXX.

Gramen junceum foliis & ſpica junci. C.B.P. 5. Moriſ. III. ſ. 8. t. 9. f. 13. Lœſ. Pruſſ. t. 29.
Junco affinis, panicula laxa ſeu laxioribus paniculis inſiſtente. Scheuchz. agr. 350.
Juncus, ſquarroſus, *culmo nudo, foliis ſetaceis, capitulis glomeratis aphyllis.* Linn. S. N. 250. Mull. Fridr. 295.
Juncus rigidus, panicula ſpicata, floribus cartilagineis. Hall. 1317.
Locus. In paludibus ceſpitoſis.

Tab. CCCCXXXI.

Juncus parvus cum pericarpiis rotundis. J. B. II. 522. Geſn. Schm. Faſc. I. t. 5. f. 13.
Gramen junceum foliis & ſpica junci. Scheuchz. agr. 322.
Juncus, bulboſus, *foliis linearibus canaliculatis, capſulis obtuſis.* Linn. S. N. 250. Sp. pl. II. 466. Jacq. Vind. 235. Hall. 1318. & 1320?
Locus. In ericetorum humidis.

Tab. CCCCXXXII.

Carex ſpica unica ſubrotunda, glumis ovatis, breviſſime ariſtatis. Hall. 1354?
Locus. In arenoſis maritimis Norvegiæ.

Tab. CCCCXXXIII.

Primula veris pallido flore elatior. Cluſ. Hiſt. I. 301. Geſn. op. t. 8. f. 64.
Verbaſculum ſylvaticum inodorum. C. B. P. 241. Kyll. Vir.
Primula, veris elatior, *foliis dentatis rugoſis, limbo corollarum plano.* Linn. Sp. pl. 204. Hall. 609.
Locus. Paſſim in pratis.

Tab. CCCCXXXIV.

Verbaſculum pratenſe odoratum. C. B. P. 241. Kyll. Vir.
Primula, veris officinalis, *foliis dentatis rugoſis, limbo corollarum concavo.* Linn. Sp. pl. 204. Hall. 610.
Locus. In pratis vulgaris.

Tab. CCCCXXXV.

Bugloſſum minus ſylveſtre. C. B. P. 257. Kyll. Vir.
Echioides. Riv. Mon. t. 7.
Lycopſis, arvenſis, *foliis lanceolatis hiſpidis, calycibus floreſcentibus erectis.* Linn. S. N. 148. Hall. 605.
Locus. Vulgaris inter ſegetes.

Tab. CCCCXXXVI.

Nuci metellæ congener planta. Camer. epit. 176.
Datura, ſtramonium, *pericarpiis ſpinoſis erectis ovatis, foliis ovatis glabris.* Linn. S. N. 170. Störk de ſtram. Hall. 586.
Locus. In ruderatis, inter Hafniam & Helſingör paſſim ad viam ſecus littus, ceterum in Dania minus vulgaris.

Tab. CCCCXXXVII.

Plantago longa. Camer. epit. 263.
Plantago anguſtifolia major. C. B. P. 189. Kyll. Vir.
Plantago, lanceolata, *foliis lanceolatis, ſpica ſubovata nuda, ſcapo angulato.* Linn. S. N. 122. Hall. 656.
Locus. Vulgaris juxta vias & agros.

Tab.

TAB. CCCCXXXVIII.

Alſine media. C. B. P. 250. Kyll. Vir.
Alſine, media, (decaſtemon) *petalis bipartitis, foliis ovato cordatis.* Linn. S. N. 221. Hall. 880.
Locus. Ad ſcaturigines & in irriguis.

TAB. CCCCXXXIX.

Rubeola arvenſis repens cœrulea. C. B. P. 334. Kyll. Vir.
Sherardia. Dill. Gen. 96. t. 3.
Sherardia, arvenſis, *foliis omnibus verticillatis, floribus terminalibus.* Linn. S. N. 116. Hall. 734.
Locus. Inter ſegetes.

TAB. CCCCXL.

Gramen bromoides panicula ſparſa, locuſtis minoribus ariſtatis. Scheuchz. agr. 511.
Bromus, triflorus, *panicula patente floribus ſubtrifloris.* Linn. S. N. 98. Sp. pl. 115. Hall. 1506. cf. 1511.
Locus. Paſſim in Daniæ nemoribus.

TAB. CCCCXLI.

Gramen hirſutum latifolium minus. C. B. theatr. 102. Geſn. Schmied. faſc. f. 14.
Gramen nemoroſum hirſutum latifolium majus. Scheuchz. agr. 317.
Juncus, piloſus d. f. *foliis planis piloſis, corymbo ramoſo.* Linn. S. N. 251. Sp. pl. 468. *floribus faſciculatis.* Hall. 1324.
Locus. In Norvegiæ ſylvis ſubalpinis.

TAB. CCCCXLII.

Carex ſpica maſcula & fœmineis tribus ſubſeſſilibus in ſummo culmo approximatis, cum folio ſingulæ ſuo, infimo culmum excedente. An Hall. 1374?
Locus. In uliginoſis ſylvaticis Daniæ.

TAB. CCCCXLIII.

Carex, globularis, *ſpica maſcula oblonga, fœminea ſeſſili ovata, foliolo florali breviori approximata.* Linn. Sp. pl. 1385. Fl. Sv. 846. Lapp. 336. Hall. 1383?
Locus. In uliginoſis.

TAB. CCCCXLIV.

Carex ſpica maſcula & fœmineis duabus ovatis approximatis ſubſeſſilibus in axillis ſuccingentium foliorum. An Carex *montana* Linn. Fl. Sv. 845. Sp. pl. 1385.? cf. Hall. 1374.
Locus. In uliginoſis.

TAB. CCCCXLV.

Echium vulgare. C. B. P. 254. Kyll. Vir. Camer. epit. 737.
Echium, vulgare, *caule tuberculato hiſpido, foliis caulinis lanceolatis hiſpidis, floribus ſpicatis lateralibus.* Linn. S. N. 148. Hall. 604.
Locus. Vulgaris in aggeribus arvorum.

TAB. CCCCXLVI.

Hyoſcyamus virginianus. Alp. exot. t. 324.
Lyſimachia lutea corniculata. C. B. P. 516.
Oenothera, biennis, *foliis ovato lanceolatis planis, caule muricato ſubvilloſo.* Linn. S. N. 263. Sp. pl. 492. Ph. Mill. ic. t. 189. Hall. 994. Mull. Fridr. 315.
Locus. Paſſim in Holſatia, e. g. circa *Aſchberg.*

TAB. CCCCXLVII.

Scabioſa pratenſis hirſuta. C. B. P. 269. Kyll. Vir.
Scabioſa, arvenſis, *corollis quadrifidis radiantibus, caule hiſpido, foliis pinnatifidis: lobis diſtantibus.* Linn. S. N. 112. Hall. 206.
Locus. Vulgaris in pratis & agris.

TAB. CCCCXLVIII.

Chamædrys. Dorft. 77. b. *Teucrium pratenſe.* Lob. Kyll. Vir.
Veronica pratenſis latifolia. Riv. Monop. 94.
Veronica, chamædrys, *racemis lateralibus, foliis ovatis ſeſſilibus rugoſis, dentatis, caule debili.* Linn. S. N. 58. Hall. 536.
Locus. In pratis & ſepibus.

TAB. CCCCXLIX.

Alſine chamædryfolia, floſculis pediculis oblongis inſidentibus. C. B. P. 250. Kyll. Vir.
Veronica folia chamædryos. Riv. Monop. 99.
Veronica, agreſtis, *floribus ſolitariis, foliis cordatis inciſis pedunculo brevioribus.* Linn. S. N. 58. Hall. 549.
Locus. In agris, arvis & cultis vulgaris.

TAB. CCCCL.

Agaricum eſculentum cæſpitoſum album, multifidum & denticulatum, denticulis aſperis. Mich. gen. t. 64. f. 2.
Hydnum quartum. Schæff. fung. t. 142.
Echinus ramoſus aculeis parallelis. Hall. 2317.
Locus. E Fridrichsdal miſit Cl. O. F. Muller.

TAB. CCCCLI.

Orobanche radice coralloide. C. B. P. 88.
Ophrys, corallorrhiza, *bulbis ramoſis flexuoſis, caule vaginato, nectarii labio trifido.* Linn. S. N. 592. Ström. Sundm. I. 109. Gunn. Fl. Norv. 126.
Corallorrhiza. Hall. 1301. t. 44.
Locus. In ſylvis Norvegiæ raro; *Haſvig* Finmarkiæ occidentalis; *Loppen* in Tromſöen; *Carlſöen.*

TAB. CCCCLII.

Chamæorchis alpina gramineo folio. C. B. P. 81.
Ophrys, alpina, *bulbis ovatis, ſcapo nudo, foliis ſubulatis, nectarii labio indiviſo obtuſo utrimque unidentato.* Linn. S. N. 592. Sp. pl. 1342. Jacq. Vind. 295. t. 9.
Orchis radicibus ſubrotundis, labello ovato, utrimque denticulo notato. Hall. 1263. t. 22.
Locus. In *Haſvig* Finmarkiæ occidentalis, & in *Carlſöen* Nordlandiæ.

TAB. CCCCLIII.

Pinguicula flore albo minore, calcare breviſſimo. Raj. hiſt. 752.
Pinguicula, alpina, *nectario conico petalo breviore.* Linn. S. N. 61. Fl. Lapp. 12. t. 12. f. 3. Hall. 293.
Locus. In *Evenæs* in Salten, *Ibeſtad* in *Aſtefiord*, *Talvig* Finmarkiæ occidentalis.
Tres has 451. 452. 453. Norvegiæ arctoæ incolas Floræ noſtræ addidit Reverendiſſ. Nidroſienſium Epiſcopus Dn. *Gunnerus.* Icones pinxit ejus Amanuenſis ornatiſſ. Dn. *Parelius.*

TAB. CCCCLIV.

Juncus acutus maritimus capitulis rotundis. C. B. P. 11. Plukn. t. 40. f. 4.
Scirpus, holoſchœnus, *culmo tereti nudo, ſpicis ſubgloboſis glomeratis pedunculatis, involucro diphyllo inæquali mucronato.* Linn. S. N. 83. Hudſ. Angl. 17.
Locus. In littoribus maritimis *Oldenburgenſibus* & *Holſaticis*, e. g. ad Albim prope *Glukſtad*, ſolo limoſo.

TAB. CCCCLV.

Rubia ſylveſtris lævis. C. B. P. 333. Kyll. Vir.
Galium, mollugo, *foliis octonis ovato linearibus, ſubſerratis, patentiſſimis, mucronatis, caule flaccido, ramis patentibus.* Linn. S. N. 118. Hall. 712.
Locus. Paſſim in nemoribus & ſepibus.

TAB.

Tab. CCCCLVI.

Lithofpermum arvenfe radice rubra. C. B. P. 258. Kyll. Vir.
Lithofpermum, arvenfe, *feminibus rugofis, corollis vix calycem fuperantibus.* Linn. S. N. 145. Hall. 594.
Locus. In arvis, rarius in Dania.

Tab. CCCCLVII.

Orchis morio mas foliis maculatis. C. B. P. 81 Kyll. Vir.
Orchis, mafcula, *bulbis indivifis, nectarii labio quadrilobo crenulato: cornu obtufo, petalis dorfalibus reflexis.* Linn. S. N. 590. Fl. Sv. 795.
Orchis radicibus fubrotundis, petalis lateralibus reflexis, labello trifido, fegmento medio longiori bifido. Hall. 1283. t. 33.
Locus. In pratis fylvaticis Daniæ & Schlefvici, rarius.

Tab. CCCCLVIII.

Convolvulus major albus. C. B. P. 294. Kyll. Vir.
Convolvulus, fepium, *foliis fagittatis poftice truncatis, pedunculis tetragonis unifloris.* Linn. Linn. S. N. 155. Sp. pl. 218. Hall. 663.
Locus. In fepibus locis humidis, minus vulgaris.

Tab. CCCCLIX.

Convolvulus minor arvenfis. C. B. P. 294. Kyll. Vir.
Convolvulus, arvenfis, *foliis fagittatis utrimque acutis, pedunculis unifloris.* Linn. S. N. 155. Hall. 664.
Locus. Inter fegetes, in agris depreffis arenofis, paffim nimis copiofe.

Tab. CCCCLX.

Solanum officinarum. C. B. P. 166. Kyll. Vir.
Solanum, nigrum, *caule inermi herbaceo, foliis ovatis dentato angulatis, umbellis nutantibus.* Linn. S. N. 173. Hall. 576.
Locus. In ruderatis & fimetis.

Tab. CCCCLXI.

Plantago latifolia major. C. B. P. 189. Kyll. Vir.
Plantago, major, *foliis ovatis glabris, fcapo tereti, fpica floribus imbricatis.* Linn. S. N. 122. Hall. 656.
Locus. Ubique in viis pratis & hortis.

Tab. CCCCLXII.

Fig. 1. *Lichenoides gelatinofum atrovirens, auriculatum & granofum.* Dill. 140. t. 20. f. 24.
Fig. 2. *Lichenoides gelatinofum palmatum, tuberculis conglomeratis.* Dill. 141. t. 19. f. 27.
Lichen, fafcicularis, *foliaceus gelatinofus, tuberculis turbinatis fafciculatis, fronde majoribus* Linn. S. N. Mant. 133.
Locus. Terreftres in umbrofis & humidis glareofis.

Tab. CCCCLXIII.

Fig. 1. *Lichen gelatinofus, laminis verticalibus undato crifpis, fuperficie denfi cefpitis irregulariter crifpa; peltis marginalibus fpadiceis.*
Fig. 2. *Lichen*, gyrofus, *gelatinofus, laminarum verticalium marginibus fubæqualibus, fuperficie denfi cefpitis eleganter gyrofa: peltis marginalibus fpadiceis.*
Nec inter Dillenianos 19—35. nec Hallerianos 2034—2041. invenio qui fatis congruant.
Locus. Terreftres in umbrofis.

Tab. CCCCLXIV.

Peziza, polymorpha, *atrofusca, carne cerea gelatinosa, primum cava, per maturitatem farcta, pileo e medio succrescente rugoso in stipite brevi crasso.*
Limsvampe, Mull. Act. Holm. 1762. t. 3.
an? *Peziza sessilis, infundibuliformis, extus hirsuta umbrina, intus nigerrima.* Hall. 2219. t. 48. f. 8.
Locus. In cortice ligni faginei. Conquisivit & extricavit per tot stadia tamque diversas formas Cl. *Zœga*, Vicarius meus, strenuus & acutissimus observator, laborum mihi gratus socius. Idem communicavit Lichenes gelatinosos tabularum 462. 463.

Tab. CCCCLXV.

Hydnum, parasiticum, *acaule arcuato rugosum tomentosum.* Linn. S. N. 724.
Locus. Passim in truncis arborum.

Tab. CCCCLXVI.

Lichen, grönlandicus, *foliaceus repens, lobis ad horizontem obliquis, rotundis concavis, fungulis marginalibus, viridulo glaucescens, inferne niger.*
Locus. E *Grönlandia* attulit ornat. Dn. *Brasen*, Chirurgus nauticus, edulem ibi, & quo multi contra hæmoptysin non sine fructu utantur.

Tab. CCCCLXVII.

Fig. 1. *Mucor* (Trichia) *capitulis miniatis, stipitibus brevibus nigris.*
Locus. In cortice Pini sylvestris.
Fig. 2. *Mucor* (Trichia) *capitulis pyriformibus rubro aurantiis, stipitibus brevibus albis.*
Locus. In cortice Pini sylvestris.
Fig. 3. *Mucor* (Trichia) *capitulis nigris, stipitibus longioribus fuscis.*
Locus. Parasitica in aliis plantis.
Fig. 4. *Mucor*, mucedo, *stipitatus, capsula globosa.* Linn. S. N. 727. Hall. 2147.
Locus. In pane situm contrahente aliisque putridis vegetabilibus.

Tab. CCCCLXVIII.

Fig. 1. *Lichenoides nigro flavum, tabulæ geographicæ instar pictum.* Dill. t. 18. f. 5.
Lichen, geographicus, *leprosus flavescens, lineolis* (maculis) *nigris mappam referens.* Linn. S. N. 709. Hall. 2063.
Locus. In alpium Norvegicarum saxis quarzosis.
Fig. 2. *Lichen leprosus cinereo glaucescens, sine scutellis, crusta rimis infinitis divisa in insulas totales & partiales subrotundas, partialibus minimis puncto notatis.*
Locus. In Bornholmia, in saxis.
Fig. 3. *Lichen leprosus, albicans, crusta rimosa insulis subrotundo angulosis, scutellis glaucis albo margine.*
Locus. In Bornholmiæ saxis.

Tab. CCCCLXIX.

Fig. 1. *Cyathus hirsutus, intus striatus, (bulbo sub cyatho).* Hall. 2214. Schæff. t. 178. *Peziza*, lentifera. Linn. S. N. 725.
Fig. 2. *Peziza*, radiata, *pileo patente membranaceo fibroso striato & zonis picto.*
Locus. In Islandia. *J. G. Kœnig.*
Fig. 3. *Peziza*, cupularis, *globoso campanulata margine crenato.* Linn. S. N. 725. Hall. 2228.
Locus. In Norvegia legi ad radices arborum.

Tab. CCCCLXX.

Fig. 1. *Lichen leprosus ruber, tuberculis nigris.*
Locus. Ex Islandia attulit *J. G. Kœnig.*
Fig. 2. *Lichen*, heclæ, *leprosus albus, venis & maculis in medio rubris, scutellis rubris.*
An *Lichen* gelidus. Linn. S. N. Mant. 133?
Locus. In saxis culminum alpium Islandicarum potissimum Heclæ. *J. G. Kœnig.*
Fig. 3. *Lichen gelatinosus, imbricatus, lobis obtusis laceris, peltis fuscis, proliferis.*
Figura major qualem ex Islandia attulit *Kœnig*; figura minor frustuli ejusdem post exsiccationem madefacti. Conferantur Dill. t. 19. f. 20. qui est Hall. 2037. & *L. nigrescens* Hudf. tum Dill. t. 19. f. 23. quem cum suo 2037. Hallerus conjungit.
Locus. Saxa irrigua alpium Islandicarum.

Tab.

TAB. CCCCLXXI.

Fig. 1. *Lichenoides corneum, marginibus eleganter fimbriatis.* Dill. 218. t. 29. f. 116. A. Hall. 1999?
Fig. 2. Dill. t. 29. f. 116. B.
Locus. Utrumque in alpibus Norvegiæ.
Fig. 3. *Lichenoides atrum corii perfici inftar exafperatum.* Dill. 220. t. 30. f. 119.
Locus. In alpibus Norvegiæ.

TAB. CCCCLXXII.

Fig. 1. *Lichen,* ventofus, *leprofus flavus, tuberculis rubris.* Linn. S. N. 709.
Locus. In Bornholmiæ rupibus apricis.
Fig. 2. *Lichen leprofus glaucefcens, tuberculis minimis rubris medio depreffis. L. ventofi* varietas?
Locus. Cum præcedente.
Fig. 3. *Lichen leprofus crufta albo glaucefcente, rimis in maculas fubrotundas divifa, tuberculis atris, in lineas curvas difpofitis.*
Locus. In fcopulis maritimis Norvegiæ.
Fig. 4. *Coralloides fungiforme carneum bafi leprofa.* Dill. t. 14. f. 1.
Lichen, ericetorum, *leprofus candidus, tuberculis incarnatis.* Linn. S. N. 709. Hall. 2042.
Locus. Ad latera foffarum cefpitofarum.

TAB. CCCCLXXIII.

Fig. 1. *Hypnum taxifolium exiguum verfus fummitatem capfuliferum.* Dill. t. 34. f. 1.
Hypnum, bryoides, *fronde fimpliciffima pinnata lanceolata, apice pedunculifera.* Linn. S. N. 703. Hall. 1776.
Fig. 2. *Hypnum taxiforme minus bafi capfulifera.* Dill. t. 34. f. 2.
Hypnum, taxifolium, *fronde fimpliciffima pinnata lanceolata, bafi pedunculifera.* Linn. S. N. 703. Hall. 1775.
Locus. Utrumque in umbrofis nemorum.

TAB. CCCCLXXIV.

Sphagnum paluftre molle deflexum, fquamis cymbiformibus. Dill. t. 32. f. 1.
Sphagnum, paluftre, *ramis deflexis.* Linn. S. N. 698. Hall. 1724.
Locus. In paludibus turfofis & ad aquas ftagnantes ubique.

TAB. CCCCLXXV.

Hypnum velutinum, capfulis ovatis cernuis Dill. t. 42. f. 61.
Hypnum, velutinum, *furculo repente, ramis confertis erectis, foliis fubulatis, antheris fubnutantibus.* Linn. S. N. 705. Hall. 1754.
Locus. Ad radices arborum in umbrofis.

TAB. CCCCLXXVI.

Bryum hypnoides alpinum, fetis & capfulis exiguis. Dill. t. 47. f. 29.
Bryum, hypnoides d, *antheris erectis, caule erecto, ramis lateralibus brevibus fertilibus.* Linn. S. N. 702. Fl. Sv. 1003. Hall. 1782.
Locus. Ad faxa in umbrofis fubalpinis.

TAB. CCCCLXXVII.

Bryum phyllitidis folio rugofo acuto, capfulis incurvis. Dill. t. 46. f. 18.
Bryum, undulatum, *antheris erectiufculis, pedunculis fubfolitariis, foliis lanceolatis carinatis undulatis patentibus ferratis.* Linn. S. N. 701. Hall. 1823.
Locus. In umbrofis & fylvis.

TAB. CCCCLXXVIII.

Bryum foliis ftriatis acuminatis reflexis, capfulis fphæricis fubnutantibus, maturitate ftriatis.
Locus. In faxis irriguis alpium Norvegicarum rarius.

C TAB.

Tab. CCCCLXXIX.

Bryum heteromallum. Dill. t. 47. f. 37.
Bryum, heteromallum, *antheris erectis, foliis setaceis secundis.* Linn. S. N. 702. Hall. 1807.
Locus. In ericetis.

Tab. CCCCLXXX.

Sphagnum subhirsutum obscure virens, capsulis rubellis. Dill. t. 32. f. 4.
Bryum, apocarpum, *antheris sessilibus terminalibus, calyptra minima.* Linn. S. N. 701. Hall. 1793.
Locus. In saxis & arboribus frequens.

MONITUM.

Cum hoc ipso tempore sub prelo sudent ultimæ plagulæ *Nomenclatoris botanici,* forma octuplicata, continentis nomina plantarum in linguis vernaculis, alphabetico ordine Lexicorum modo dispofita, eum ipsum in finem adornati, ut & præsto sit libellus in quo sine mora inveniant, qui ista nomine scire cupiunt, & Enumeratio nostra plantarum Floræ Danicæ, prelo mox post istum nomenclatorem subjicienda, liberetur onere istorum nominum, omisimus in hac nomenclatura mentionem nominum vernaculorum & omittemus porro, ablegando B. L. ad istum nomenclatorem, & addendo solum quæ porro innotescent ibi deficientia talia nomina.

Promissi memor supero anno dati, de edendis binis per annum fasciculis, cum artifices mei Hafniæ degentes hactenus non sufficiant operæ, petii & impetravi a clarissimo *Jo. Andr. Murray*, Botanicæ Professore in Universitate Gœttingensi, hoc levamen, ut ipso moderante a perito ejus universitatis pictore *Kaltenhofer* pingantur subinde plantæ ex earum numero, quæ agro Hafniensi & Gœttingensi communes sunt, qui celeberrimi viri labor, quippe propria manu plantas pictoris oculis subjiciendas legentis, tanto mihi majus amicitiæ testimonium est, tantoque magis sinceras publice reddendas gratias poscit, quanto minus ad propriam augendam gloriam aptus videtur labor vulgatioribus plantis impensus. Sunt autem a Kaltenhofero pictæ 428. 433. 434. 435. 436. 437. 439. 445. 447. 448. 449. 455. 458, 459. 460. 461. Paullatim cryptantheras plantas, quæ parcius in præcedentibus fasciculis comparuerunt, largiore manu reliquis plantis phanerantheris miscebimus, earumque minores, lichenes muscosque, binos, ternos quaternosve in singulis tabulis, quemadmodum videre licet in tabulis 467--473, postremas autem septem tabulas 474--480. non nisi unicum quælibet muscum exhibentes, quippe jam inde ab aliquot annis paratas, æqui bonique B. L. consulet.

HAFNIÆ, typis CL. PHILIBERT.
Prostat apud Autorem, & Bibliopolas Philibert & Heineck & Faber.





Flora Danica Tab. CCCCXXIII.








Flora Danica Tab. CCCCXXVI.



Flora Danica Tab CCCCXXVII.



Flora Danica Tab. CCCCXXVIII.




Flora Danica Tab. CCCCXXIX.



Flora Danica Tab. CCCCXXX.



Flora Danica Tab. CCCCXXXI.



Flora Danica Tab. CCCCXXXII.







Flora Danica Tab. CCCCXXXV.





Flora Danica Tab CCCCXXXVII.






Flora Danica Tab. CCCCXXXIX.









Flora Danica Tab CCCCXLIII.



Flora Danica Tab. CCCCXLIV.
















Flora Danica Tab. CCCCLI.




Flora Danica Tab. CCCCLII.




Flora Danica Tab. CCCCLIII.



Flora Danica Tab. CCCCLIV.


















Flora Danica Tab. CCCCLXII.

1.



2.




1
2





Flora Danica Tab. CCCCLXVI.




Flora Danica Tab. CCCCLXVII.




1.




2



3




Flora Danica Tab: CCCCLXIX



Flora Danica Tab. CCCCLXX.

1.




2



3



Flora Danica Tab. CCCCLXXI



Flora Danica Tab. CCCCLXXII.

1.




2



3



4



Flora Danica Tab. CCCCLXXIII.



Flora Danica Tab. CCCCLXXIV.



Flora Danica Tab. CCCCLXXV



Flora Danica Tab. CCCCLXXVI.



Flora Danica Tab. CCCCLXXVII.



Flora Danica Tab. CCCCLXXVIII.



Flora Danica Tab. CCCCLXXXIX.



Flora Danica Tab. CCCCLXXX.



FLORÆ DANICÆ

ICONUM

FASCICULUS NONUS.

MDCCLXX.

NOMENCLATURA
ET
LOCI NATALES PLANTARUM,
quas nonus hic Fasciculus exhibet.

TAB. CCCCLXXXI.

C*ornus fœmina.* C. B. P. 247. Kyll. Vir.
Cornus, sanguinea, *arborea cymis nudis, ramis rectis.* Linn. S. N. 125. Hall. 816.
Locus. Passim sed rarius in dumetis Daniæ & Slesvici.

TAB. CCCCLXXXII.

Pulmonaria maculosa & non maculosa. C. B. P. 259. Kyll. Vir.
Pulmonaria, officinalis, *foliis radicalibus ovato cordatis scabris.* Linn. S. N. 146. Hall. 597.
Locus. Vulgaris in sylvis.

TAB. CCCCLXXXIII.

Pulmonaria angustifolia, cœruleo flore. Clus. Pann. 673. 674. Kyll. Vir.
Pulmonaria, angustifolia, *foliis radicalibus lanceolatis.* Linn. S. N. 146. Hall. 598.
Locus. Mixta præcedenti, sed paullo rarior.

TAB. CCCCLXXXIV.

Menthastrum. Fuchs. 292. Riv. Monop. irr. 51.
Mentha sylvestris folio longiore. C. B. P. 227.
Mentha, sylvestris, *spicis oblongis foliis oblongis tomentosis serratis sessilibus, staminibus corolla longioribus.* Linn. S. N. 392. *M. longifolia.* Huds. 221. Hall. 227.
Locus. In Dania *Linn. Sp. pl.* 802. mihi nondum obvia, in Holsatia non longe ab *Oldesloh* ad amnem.

TAB. CCCCLXXXV.

Scordium. Gesn. Op. Schmid. fig. lign. C. & fig. æn. 85.
Scorodonia. Riv. Monop. t. 12.
Teucrium, scorodonia, *foliis cordatis serratis petiolatis, racemis lateralibus secundis, caule erecto.* Linn. S. N. 388. Hall. 282.
Locus. In *Hasbrook* prope *Hunte* Comitatus Delmenhorst.

TAB. CCCCLXXXVI.

Bellis ramosa umbellifera. Cornut. Canad. t. 194.
Aster, annuus, *foliis lanceolatis, inferioribus crenatis, caule corymboso, pedunculis nudis, calycibus hemisphæricis.* Linn. S. N. 555.
Locus. Prope *Altona, auf der Anhöhe hinter dem Sklavenhof,* rarius, at omnium copiosissime in dumetis horti *Plœnensis*, aufuga ut videtur ex hortis, at nunc indigena luxurians uti *Erigeron canadense.* Perennat.

TAB. CCCCLXXXVII.

Millefolium aquaticum seu viola aquatica, caule nudo. C. B. P. 141. Kyll. Vir.
Hottonia, palustris, *pedunculis verticillato multifloris.* Linn. S. N. 152. Hall. 632.
Locus. Vulgatissima in fossis & paludibus.

TAB. CCCCLXXXVIII.

Rubus, arcticus, *foliis ternatis, caule inermi unifloro.* Linn. S. N. 349. Fl. Lapp. t. 5. f. 2.
Locus. In alpibus extremæ Norvegiæ, in confiniis Lapponiæ Suecicæ, unde allatam ab Ill. *Thodal*, nunc Islandiæ Præfecto, tunc ad fines Norvegiæ constituendos delegato, colimus in horto, sed sterilem & luxuriantem petalis laceris numeroque variantibus.

TAB.

Tab. CCCCLXXXIX.

Kali minus album semine splendente. C. B. P. 289. Kyll. Vir.
Chenopodium, maritimum, *foliis subulatis semicylindricis.* Linn. S. N. 195.
Locus. Ubique in littoribus maritimis.

Tab. CCCCXC.

Gramen junceum spicatum seu Triglochinum. C. B. P. 6. Theatr. 80.
Triglochinum, palustre, *capsulis trilocularibus sublinearibus.* Linn. S. N. 256. Hall. 1308.
Locus. Passim in uliginosis.

Tab. CCCCXCI.

Amanita petiolo procero, anulato, pileo cervino, squamis fuscis exasperato, lamellis cervinis. Hall. 2399. Enum. 781.
Locus. In vivario Jægersburgensi.

Tab. CCCCXCII.

Veronica pratensis serpyllifolia. C. B. P. 247. Kyll. Vir.
Veronica, serpyllifolia, *racemo terminali subspicato, foliis ovatis glabris crenatis.* Linn. S. N. 57. Hall. 546.
Locus. Vulgatissima, ad vias & in arvis.

Tab. CCCCXCIII.

Nummularia major lutea. C. B. P. 309. Kyll. Vir.
Lysimachia, nummularia, *foliis subcordatis, floribus solitariis, caule repente.* Linn. S. N. 153. Hall. 629.
Locus. Vulgaris in humidis.

Tab. CCCCXCIV.

Acorus adulterinus. C. B. P. 34. Kyll. Vir.
Iris, pseudoacorus, *corollis imberbibus, petalis interioribus stigmate minoribus, foliis ensiformibus.* Linn. S. N. 77. Hall. 1260.
Locus. Vulgatissima ad ripas fluviorum & fossarum.

Tab. CCCCXCV.

Aparine vulgaris. C. B. P. 334. Kyll. Vir.
Galium, aparine, *foliis octonis, lanceolatis, carinatis, scabris, retrorsum aculeatis, geniculis villosis, fructibus hispidis.* Linn. S. N. 118. Hall. 723.
Locus. Vulgatissimum ad sepes & in ruderatis.

Tab. CCCCXCVI.

Adianthum album floridum seu filicula petræa crispa. Plukn. t. 3. f. 2.
Osmunda, crispa, *frondibus supradecompositis, pinnis alternis subrotundis incisis.* Linn. S. N. 685. Hall. 1689. Enumer. 1198.
Locus. In alpibus Norvegiæ ad rupium latera austro opposita in *Walders & Voss.*

Tab. CCCCXCVII.

Lonchitis aspera. C. B. P. 359. Camer. epit. 664.
Polypodium, lonchitis, *frondibus pinnatis, pinnis lunulatis ciliato serratis declinatis, stipitibus strigosis.* Linn. S. N. 692. Hall. 1717. Gunn. Fl. Norv. 49. Act. Nidr. Tom. IV. Enum. 1214.
Locus. Passim in subalpinis Norlandiæ & Finmarkiæ.

Tab. CCCCXCVIII.

Aconitum racemosum bacciferum. C. B. P. 183. Kyll. Vir.
Actæa, spicata, *racemo ovato, fructibus baccatis.* Linn. S. N. 359. Hall. 1076.
Locus. Passim in sylvis Daniæ & Norvegiæ.

TAB. CCCCXCIX.

Chelidonia rotundifolia minor. C. B. P. 309. Kyll. Vir.
Ranunculus, ficaria, *foliis cordatis angulatis petiolatis, caule unifloro.* Linn. S. N. 378. Hall. 1160.
Locus. In hortorum & cultorum umbrosis ubique.

TAB. D.

Lampsane. Dod. pemt. 675. Kyll. Vir.
Lapsana, communis, *calycibus fructus angulatis, pedunculis tenuibus ramosissimis.* Linn. S. N. 526. Hall. 6.
Locus. Vulgaris in sylvis & ad sepes.

TAB. DI.

Hieracium chondrillæ folio glabro, radice succisa. C. B. P. 127. Kyll. Vir.
Leontodon, autumnale, *caule ramoso, pedunculis squamosis, foliis lanceolatis dentatis integerrimis glabris.* Linn. S. N. 522. Hall. 28.
Locus. Vulgatissimum in pratis & pascuis.

TAB. DII.

Antirrhinum arvense minus. C. B. P. 212. Kyll. Vir.
Antirrhinum, minus, *foliis plerisque alternis lanceolatis obtusis, caule ramosissimo diffuso.* Linn. S. N. 411. Hall. 335.
Locus. In cultis, ruderatis, arvis, glareosis frequens.

TAB. DIII.

Bellis sylvestris minor. C. B. P. 267. Kyll. Vir.
Bellis, perennis, *scapo nudo.* Linn. S. N. 560. Hall. 93.
Locus. Ubique in pascuis.

TAB. DIV.

Polygonum angustissimo & gramineo folio. C. B. P. 281. Kyll. Vir.
Scleranthus, annuus, *calycibus fructus patulis.* Linn. S. N. 306. Hall. 1550.
Locus. Vulgaris in arvis arenosis.

TAB. DV.

Arum vulgare maculatum & non maculatum. C. B. P. 195. Kyll. Vir.
Arum, maculatum, *acaule, foliis hastatis integerrimis, spadice clavato.* Linn. S. N. 603. Hall. 1302.
Locus. Copiose in *Fionia* ad sæpes, omnium copiosissime in Insula *Fennöe* prope Middelfarth.

TAB. DVI.

Damasonium flore albo. Riv. t. 5.
Serapias, grandiflora, *bulbis fibrosis, foliis ensiformibus, floribus erectis, nectarii labio obtuso petalis breviore.* Linn. S. N. 594.
Epipactis caule paucifloro, lineis in obtuso labello levibus. Hall. 1293. tab. 41.
Locus. Rarius in sylvis densis, e. g. in sylva prope *Dronninggaard.*
Epipactis

TAB. DVII.

Scrophularia aquatica major. C. B. P. 235. Kyll. Vir. p. 148. l. 1. Camer. epit. 867.
Scrophularia, aquatica, *foliis cordatis obtusis petiolatis decurrentibus, caule membranis angulato, racemis terminalibus.* Linn. S. N. 413. Hall. 326.
Locus. Passim in Siællandia, in humidis spongiosis umbrosis.

TAB. DVIII.

Aquifolium. Cam. epit. 84. Kyll. Vir.
Ilex, aquifolium, *foliis ovatis acutis ſpinoſis.* Linn. S. N. 130. Hall. 667.
Locus. In omnibus ſylvis Sleſvici, Holſatiæ & Oldenburgi.

TAB. DIX.

Sonchus lævis laciniatus muralis, parvis floribus. C. B. P. 124.
Prenanthes, muralis, *floſculis quinis, foliis runcinatis.* Linn. S. N. 521. Hall. 18.
Locus. Vulgaris in ſylvis, ad ſepes murosque.

TAB. DX.

Equiſetum ſub aqua repens foliis bifurcis. Lœſ. pruſſ. t. 12.
Ceratophyllum, ſubmerſum, *foliis dichotomo trigeminis, fructibus muticis.* Linn. S. N. 628. Hall. 1599.
Locus. In foſſis prope *Fridrichſtadt* in *Eyderſtædt.*

TAB. DXI.

Anagallis aquatica folio ſubrotundo. C. B. P. 252. Kyll. Vir.
Veronica, beccabunga, *racemis lateralibus, foliis ovatis planis, caule repente.* Linn. S. N. 58. Hall. 534.
Locus. In rivis & ad ſcaturigines.

TAB. DXII.

Calamintha arvenſis verticillata. C. B. P. 229. Kyll. Vir.
Mentha, arvenſis, *floribus verticillatis, foliis ovatis acutis ſerratis, ſtaminibus corollam æquantibus.* Linn. S. N. 392. Hall. 223.
Locus. Frequens in agris.

TAB. DXIII.

Senecio minor vulgaris. C. B. P. 131. Kyll. Vir.
Senecio, vulgaris, *corollis nudis, foliis pinnato ſinuatis amplexicaulibus, floribus ſparſis.* Linn. S. N. 551. Hall. 58.
Locus. Ubique in cultis, ruderatis.

TAB. DXIV.

Saxifraga rotundifolia alba. C. B. P. 309. Kyll. Vir.
Saxifraga, granulata, *foliis caulinis reniformibus lobatis, caule ramoſo, radice granulata.* Linn. S. N. 304. Hall. 976.
Locus. Vulgaris in paſcuis & apricis graminoſis.

TAB. DXV.

Alſine veronicæ folio, floſculis cauliculis adhærentibus. C. B. P. 250. Kyll. Vir.
Veronica, arvenſis, *floribus ſolitariis: foliis cordatis inciſis pedunculo longioribus.* Linn. S. N. 58. Hall. 548.
Locus. Vulgatiſſima in cultis & arvis.

TAB. DXVI.

Polygala major. C. B. P. 215. Kyll. Vir.
Polygala, vulgaris, *floribus criſtatis racemoſis, caulibus herbaceis ſimplicibus procumbentibus, foliis lineari lanceolatis.* Linn. S. N. 470. Hall. 344.
Locus. Vulgaris in pratis & paſcuis ſiccis.

Tab. DXVII.

Lyſimachia biſolia, flore globoſo luteo. C. B. P. 242. Kyll. Vir.
Lyſimachia, thyrſiflora, *racemis lateralibus pedunculatis.* Linn. S. N. 152. Hall. 631.
Locus. In paludibus & foſſis torfaceis.

Tab. DXVIII.

Lychnis viſcoſa, flore muſcoſo. C. B. P. 206.
Cucubalus, otites, *floribus dioicis, petalis linearibus indiviſis.* Linn. S. N. 309. Hall. 920.
Locus. In apricis ſiccis partis ſeptentrionalis Inſulæ *Sylt, Lyſt* dictæ.

Tab. DXIX.

Jacea nigra. C. B. P. 271. Kyll. Vir. S. Paul. Dan. t. 256.
Centaurea, Jacea, *calycibus ſcarioſis laceris, foliis lanceolatis, radicalibus ſinuato dentatis, ramis angulatis.* Linn. S. N. 573. Hall. 195.
Locus. Frequens in paſcuis apricis & arvis.

Tab. DXX.

Jacea latifolia capite hirſuto. C. B. P. 271. Kyll. Vir.
Centaurea, phrygia, *calycibus recurvato plumoſis, foliis indiviſis oblongis ſcabris.* Linn. S. N. 572. Hall. 188.
Locus. Paſſim in Dania & Ducatibus.

Tab. DXXI.

Parietaria officinarum & Dioſcoridis. C. B. P. 121.
Parietaria, officinalis, *foliis lanceolato ovatis, pedunculis dichotomis, calycibus diphyllis.* Linn. S. N. 1612.
Locus. Paſſim in Holſatia in ruderatis, e. g. in monte arcis *Plœnenſis.*

Tab. DXXII.

Vicia ſativa. C. B. P. 344.
Vicia, ſativa, *leguminibus ſeſſilibus ſubbinatis erectis, foliis retuſis, ſtipulis notatis.* Linn. S. N. 488. Hall. 430.
Locus. Vulgaris inter ſegetes.

Tab. DXXIII.

Lamium purpureum fœtidum folio ſubrotundo. C. B. P. 230. Kyll. Vir.
Lamium, purpureum, foliis cordatis obtuſis petiolatis. Linn. S. N. 393. Hall. 272.
Locus. Vulgatiſſum in cultis & fimetis.

Tab. DXXIV.

Petaſites minor. C. B. P. 197. *Flore albo.* Camer. epit. 593.
Tuſſilago, alba, *thyrſo faſtigiato floſculis fœmineis nudis paucis.* Linn. S. N. 550. Hall. 139.
Locus. Prope *Soröe* fide *J. G. Kœnig.*

Tab. DXXV.

Alſine media. C. B. P. 250. Kyll. Vir.
Alſine, media, *pentſtemon petalis bipartitis, foliis ovato cordatis.* Linn. S. N. 221. Hall. 880. cf. *Decaſtemonem* tab. 438.
Locus. Ubique in cultis & ruderatis.

Tab. DXXVI.

Geniſta tinctoria germanica. C. B. P. 395. *Geniſtella tinctoria ſupina.* Kyll. Vir.
Geniſta, tinctoria, *foliis lanceolatis glabris, ramis ſtriatis teretibus erectis.* Linn. S. N. 475. Hall. 350.
Locus. Vulgaris in ericetis Jutlandicis & Sleſvicenſibus.

Tab. DXXVII.

Lathyrus ſylveſtris luteus foliis viciæ. C. B. P. 344. Kyll. Vir.
Lathyrus, pratenſis, *pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis ſimpliciſſimis, foliolis lanceolatis.* Linn. S. N. 487. Hall. 436.
Locus. Vulgaris in pratis.

TAB. DXXVIII.

Nasturtium sylvestre tenuissime divisum. C. B. P. 105. *Sophia Chirurgorum.* Kyll. Vir.
Sisymbrium, Sophia, *petalis calyce minoribus, foliis decomposito pinnatis.* Linn. S. N. 440. Hall. 484.
Locus. Vulgatissimum in maceriis, muris, tectis.

TAB. DXXIX.

Polygonum minus seu millegrana major. C. B. P. 281. Kyll. Vir.
Herniaria glabra. Linn. S. N. 194. Hall. 552.
Locus. Vulgaris in arvis arenosis.

TAB. DXXX.

Althæa Dioscoridis & Plinii. C. B. P. 315. Kyll. Vir.
Althæa, officinalis, *foliis simplicibus tomentosis.* Linn. S. N. 459. Hall. 1074.
Locus. Passim in littoribus insularum minorum Danicarum.

TAB. DXXXI.

Gramen typhoides asperum primum. C. B. Scheuchz. agr. 61.
Phalaris, phleoides, *panicula cylindrica spiciformi, glabra, passim vivipara.* Linn. S. N. 86. Hall. 1531.
Locus. Passim in apricis pascuis, e. g. in collibus circa *Niemölle.*

TAB. DXXXII.

1. *Lichen*, miniatus, *foliaceus gibbus punctatus, subtus fulvus.* Linn. S. N. 712. Hall. 1999. t. 47. f. 2. Dill. t. 30. f. 127. Enum. 262.
   Locus. In Norvegiæ & Islandiæ rupibus alpinis.
2. *Ejusdem varietas lobis minoribus densioribus.* Mich. t. 54. f. 1.
   Ex Islandia.
3. *Lichen*, saccatus, *foliaceus repens subrotundus, peltis depressis subtus saccatis.* Linn. S. N. 712. Huds. *immersus.* Hall. 1995. Dill. t. 30. f. 121. Enum. 260.
   In alpibus terrestris, rarior.

TAB. DXXXIII.

Lichen, horizontalis, *coriaceus repens planus subtus avenius, peltis marginalibus horizontalibus.* Linn. S. N. 712. Mant. 132. Hall. 1991. Dill. t. 28. f. 104. Enum. 258. 363.
Locus. Terrestris, in Norvegia sine dubio reperiundus. Ad sicca exemplaria Dni *Zœga* pictus. Venas cancellatas superficiei inferioris sculptoris opus B. L. excuset.

TAB. DXXXIV.

1. *Elvela*, atra, *pileo lobis difformibus non clausis, atra, parva.*
   Ex Islandia attulit *Kœnig.*
2. *Elvela*, æruginosa, *minima pileo difformi viridissima.*
   An Peziza viridissima petiolata, scypho infundibuliformi? Hall. 2236. Enum. 602.
   In ligno querno. *J. G. Kœnig.*
3. *Hydnum*, tomentosum, *stipitatum pileo plano-infundibuliformi.* Linn. S. N. 724. Enum. 656.
   In arboribus.

TAB. DXXXV.

1. *Hypnum*, squarrosum, *ramis vagis, foliis lanceolatis complicato carinatis quinquefariam recurvatis.* Linn. S. N. 704. Hall. 1733. Dill. t. 39. f. 38. Enum. 936. 1059.
   In graminosis humidis.
2. *Hypnum*, cupressiforme, *surculis subpinnatis, foliis secundis recurvis apice subulatis.* Linn. S. N. 704. Dill. t. 37. f. 23. Enum. 932.
   Ad radices arborum.

Tab. DXXXVI.

Embolus, obvelatus, *gregarius, cervini coloris, fungulis multis volva communi obvelatis, clavis in cupulis pedicellatis.*
In Horto, in corticis frusto. *Zœga.*

Tab. DXXXVII.

1. *Bryum*, pyriforme, *antheris erectis obovatis, calyptra subulata, surculis acaulibus, foliis ovatis muticis.* Linn. S. N. 701. Hall. 1832. Dill. t. 44. f. 6. Enum. 959. 1158.
In pratis, & ad aggeres.
2. *Bryum*, truncatulum, *antheris erectis subrotundis, operculo mucronato.* Linn. S. N. 702. Hall. 1839. Dill. t. 45. f. 7. Enum. 972. 1159.
Ad agros, fossas & sepes.
3. *Bryum*, striatum, *antheris sessilibus sparsis, calyptris striatis sursumve pilosis.* Linn. S. N. 701. Hall. 1798. 1799. Dill. t. 55. f. 8. Enum. 957. 1124. 1125.
In arboribus.

Tab. DXXXVIII.

1. *Bryum, foliis capillaribus, capsulis ovalibus erectis in pedunculis brevibus.*
In Saxis Norvegiæ.
2. *Bryum, foliis setaceis curvatis, capsulis erectis obtuse ovatis, capitello oblique rostrato, apophysi capitulo subjecta.*
In huma irrigua atra schisti montis *Eckeberg* prope Christiania, agnoscitur calyptra nigra in capsula viridi, diversum a *B. viridulo.*
3. *Bryum, foliis subulatis, capsulis sphæricis striatis in pedunculis brevibus lateralibus.*
In alpibus Norvegiæ.
cf. *Bryum foliis mollibus subulatis, setis brevissimis alaribus, capsulis ovatis.* Hall. 1802. t. 46. f. 8. Enum. 1128.
4. *Mnium*, cirrhatum, *foliis arefactione revolutis.* Linn. S. N. 700. Dill. t. 48. f. 42. Enum. 995. cf. Hall. 1786.
In sylvis & ad sepes.

Tab. DXXXIX.

Lichen, rangiferinus sylvestris. Dill. t. 16. f. 29. Enum. 280.
In Norvegiæ alpibus & sylvis sterilibus.

Tab. DXL.

Fungus difficulter ad ullum notorum generum referendus stipite ex albo livescente, suberoso, sesquipollicari, pileo glandis forma fusco, cute subcornea, papillosa poris cellularum carnis mucilagine seu gelatina repletarum.
Reperi in vivario Jægersburgensi prope *Torbeck*, superiore autumno unicum exemplar, in trunco arboris resectæ.

MONITUM.

Citatur hic primum *Enumeratio plantarum Floræ Danicæ, id est sponte nascentium in Regnis Daniæ & Norvegiæ; Ducatibus Slesvici & Holsatiæ; Comitatibus Oldenburgi & Delmenhorstiæ*, cujus prior pars Cryptantherarum classem continens cum hoc nono fasciculo editur, altera pars reliquas omnes classes complectens proximo anno edetur.

HAFNIÆ, typis CL. PHILIBERT

Prostat apud Autorem, & Bibliopolas Philibert & Heineck & Faber.



Flora Danica Tab. CCCCLXXXXII.











Flora Danica Tab. CCCCLXXXVII.



Flora Danica Tab. CCCCLXXXVIII.










Flora Danica Tab. CCCCXCII.




Flora Danica Tab. CCCCXCIII.







Flora Danica Tab. CCCCXCVI.



Flora Danica Tab. CCCCXCVII.





Flora Danica Tab. CCCCXCIX







Flora Danica Tab. DII.





Flora Danica Tab DIV.



Flora Danica Tab. DV.





Flora Danica Tab. DVII.












Flora Danica Tab. DXII.







Flora Danica Tab. DXV.



Flora Danica Tab. DXVI.





Flora Danica Tab. DXVIII.














Flora Danica Tab. DXXIV.







Flora Danica Tab. DXXVI.







Flora Danica Tab. DXXIX.








Flora Danica Tab. DXXXII.




Flora Danica Tab. DXXXIII.





Flora Danica Tab. DXXXIV.



Flora Danica Tab DXXXV.




Flora Danica Tab. DXXXVI.





1.
2.
3

Flora Danica Tab. DXXXVIII.



Flora Danica Tab. DXXXIX.



Flora Danica Tab. DXL.

